

Preparação para colonoscopia – KLEAN-PREP®



INFORMAÇÕES GERAIS

ADQUIRA NA FARMÁCIA o produto KLEAN-PREP® (não precisa de receita)

Para que o exame tenha sucesso, o intestino terá de estar completamente limpo, sem vestígios de fezes. Para que a limpeza intestinal seja eficaz, deve seguir corretamente as seguintes instruções:

1

DIETA: POBRE EM FIBRAS NOS 5 DIAS ANTERIORES AO EXAME

NÃO PODE INGERIR

Frutas, legumes e verduras, cereais com casca, sementes, nem crus nem cozinhados

Se for habitualmente **obstipado(a)** (prisão de ventre) ou se tiver realizado uma **colonoscopia** prévia com **preparação intestinal inadequada**, deverá adquirir, adicionalmente, o medicamento laxante de venda livre **bisacodilo** (ex. Dulcolax®) e fazer 1 ou 2 comprimidos nas 3 noites anteriores ao exame. Se tomar ferro oral deve suspender 6 dias antes do exame.

- **NOTA IMPORTANTE:** Após o início da ingestão do preparado de limpeza intestinal, **não poderá ingerir mais nenhum alimento sólido**. Poderá apenas ingerir **líquidos transparentes**: água, chá açucarado, sumos de fruta sem polpa, refrigerantes, bebidas isotónicas, café sem leite e canja ou caldos de carne sem resíduos (coados). Adicionalmente, poderá ingerir **gelatinas de cor clara** (ananás, laranja, limão, pêsego). Não ingira outros produtos, tais como suplementos alimentares, mesmo que propostos na Farmácia.


2

LIMPEZA INTESTINAL (leia também a bula do produto mas siga o plano proposto a seguir)

Dissolver cada saqueta em 1L de água morna e misturar bem (4 saquetas em 4L de água). Para facilitar a ingestão do produto, poderá colocar o preparado a refrescar no frigorífico.

DIA ANTERIOR AO EXAME

1ª dose
19h ou
20h



- Faça uma refeição ligeira pobre em fibras, respeitando as indicações referidas acima, cerca de 2 horas antes da 1ª dose.

- **Noite da véspera (19h ou 20h):** Tomar a solução, bebendo **250mL de 15 em 15 minutos**. Deverá ingerir **2 litros em 2 horas**.

- Se sentir náuseas pode diminuir o ritmo de ingestão.

- Até à hora de deitar, poderá continuar a ingerir **líquidos transparentes**.

DIA DO EXAME

2ª toma
4-5 h antes
do exame



- **Madrugada/manhã do dia do exame (4-5 horas antes do exame):** Tomar a solução, bebendo **250mL de 15 em 15 minutos**. Proceder do mesmo modo como indicado acima - ingerir **2 litros em 2 horas**; se sentir náuseas pode diminuir o ritmo de ingestão.

- Nos intervalos entre as 2 tomas e até 2 a 3 horas antes do exame, poderá continuar a ingerir **líquidos transparentes**.

- **NÃO PODERÁ INGERIR NADA NO MÍNIMO 2 a 3 HORAS ANTES DO EXAME!**

NOTA: A qualidade deste exame depende do **cumprimento rigoroso** da preparação intestinal.

Em caso de dúvidas contactar a nossa Unidade